



EviDos

Banbrytande beslutsstöd för säker läkemedelshantering – perfekt att använda vid varje möte med patient.

Vilka kan använda EviDos?

Att arbeta inom vården och tandvården är att dagligen möta människor som på ett eller annat sätt befinner sig i en beroendeställning till dig som personal. Inte minst vilar det ett stort ansvar på den som hanterar och ordinerar läkemedel. Här är det viktigt med goda rutiner och smarta verktyg – som EviDos. EviDos har utvecklats tillsammans med och för yrkesgrupper som hanterar läkemedel såsom läkare, tandläkare, sjuksköterskor, tandhygienister och apotekspersonal.

Effektivitet och nytta

Läkemedel är i regel bra produkter; det är användningen som är problemet. Läkemedel är sjukvårdens vanligaste och viktigaste behandlingsform. Varje dag används mer än 18 miljoner definierade dygnsdoser av läkemedel i Sverige. I dagens sjukvård finns ett problem med felaktiga läkemedelsordinationer och att det ordineras läkemedel där interaktion mellan läkemedel orsakar läkemedelskomplikationer som medför onödigt lidande för den drabbade.

The screenshot shows the EviDos web application interface. The search bar contains the word "waran". Below the search bar, there is a list of medications with their respective interaction levels:

- Alvedon** Suppositorium, 1 g, Paracetamol (Gaxolmit/Kline Consumer Healthcare AB)
- Cilest 28** Tablett, , Norgestimat och etinylestradiol (Janssen-Cilag AB)
- Ciprofloxacín Actavis** Tablett, 750 mg, Ciprofloxacín Actavis AB, Actavis Group hf.
- Desolett** Tablett, 21 st (enfas), , Desogestrel och etinylestradiol (Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, NY Organon)
- Ebtrex** Injektionsvätska, lösning, för-fyllt spruta, 20 mg/ml, Metotrexat. Sandoz A/S, EBEWE Pharma Ges.m.b.H.NfG.KG
- Waran** Tablett, 2,5 mg, Warfarin (Takeda Pharma AB)

On the right side, there are detailed interaction reports for:

- C3 ciprofloxacín - warfarin**: Medicinsk konsekvens: Effekten av warfarin kan öka hos vissa patienter vid samtidig administrering av ciprofloxacín. Hos de flesta patienterna är interaktionen dock ej av klinisk betydelse. Hos pediatriska patienter kan interaktionen vara mer relevant. Rekommendation: Noggrann monitorering av INR rekommenderas.
- C2 etinylestradiol - warfarin**: Medicinsk konsekvens: Warfarinpotensen kan öka vid samtidig behandling. Indikationer för warfarinbehandling är ofta kontraindikationer för etinylestradiolbehandling. Rekommendation: Titta INR-kontroller rekommenderas när samtidig behandling inleds eller avslutas. Justera warfarindosen vid behov.
- B3 ciprofloxacín - paracetamol**: Medicinsk konsekvens: Effekten av paracetamol kan föränas något vid samtidig behandling med ciprofloxacín. Rekommendation: Intag av de båda läkemedlen bör separeras i de fall snabb effekt av paracetamol önskas.

EviDos är pedagogiskt och enkelt att navigera – oavsett datorvana.

Därför EviDos

- EviDos är ett webb-baserat effektivt verktyg som, i samma vy, ger användaren en samlad och uppdaterad information. Verktøget hämtar sin information från säkra databaser.
- EviDos kan skapa en läkemedelslista och presenterar interaktioner mellan läkemedel.
- EviDos räknar ut en dosering och presenterar ordinationen med både siffror och bild.
- EviDos kontrollräknar en dosering och larmar om doseringen är orimlig.
- EviDos kan integreras med andra system.
- EviDos är CE-märkt.

Köpa

För att komma igång tecknas en användarlicens – sen är det bara att börja använda!

Kontakt

EviDos AB
Campus Gräsvik 5
371 74 Karlskrona
0732-426962, info@evidos.se,
www.evidos.se

